


INFORMACIJA APIE LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĘ SITUACIJĄ 2006-2016 M. AKMENĖS RAJONE

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus specialistai vykdo lytiškai plintančių infekcijų ir ŽIV epidemiologinę priežiūrą.

Lytiškai plintančios infekcijos (LPI) – tai infekcijos, kuriomis užsikrečiama lytinių santykių (vagininių, oralinių arba analinių) metu nuo šiomis infekcijomis užsikrėtusio lytinio partnerio. Šios infekcijos yra aktuali visuomenės sveikatos problema, tačiau registruoti duomenys ne visada atspindi realią sergamumo situaciją.

2006-2016 m. laikotarpiu Šiaulių apskrityje LPI persirgo 592 asmenys. Šiaulių apskrities rajonuose bendras registruojamas LPI atvejų skaičius yra nedidelis, mažiausias – Pakruojo ir Joniškio rajonuose (1 pav.).




1 pav. LPI susirgimų skaičius Šiaulių administracinėje teritorijoje 2006-2016 m.

Per 2006-2016 metų laikotarpį iš 60 LPI sergančiųjų Akmenės rajone, registruota 3 chlamidijos atvejai, 10 gonorėjos atvejų, 34 sifilio atvejai ir 13 ŽIV susirgimo atvejų.


Žmogaus imunodeficitu viruso infekcija (ŽIV)

ŽIV – žmogaus imunodeficitu virusas, naikinantis žmogaus imuniteto ląsteles, saugančias organizmą nuo bakterijų, virusų, grybelių, pirmuonių. Paskutinė ŽIV infekcijos stadija vadinama

AIDS – įgytu imunodeficitu



Gonorėja sukelia bakterija *Neisseria gonorrhoeae*, gyvenanti lyties organų, akių, gerklės, išeinamosios angos gleivinėje. Simptomai pasireiškia praėjus 3–5 dienoms po infekcijos patekimo į organizmą. Dažniausiai atsiranda pūlingos išskyros ir skausmas šlapinantis, kartais nepastebima jokių ligos simptomų. Laiku nediagnozuota ir negydoma liga progresuoja ir gali sukelti nevaisingumą. Gonorėja yra pagydoma liga, jei gydymas pradedamas pirminiuose ligos vystymosi etapuose. Per 10 metų laikotarpį (2006-2016 metais) Akmenės rajone užregistruota 10 gonorėjos atvejų (4 pav.).



4 pav. Susirgusių gonorėja atvejų skaičius Akmenės rajone 2006-2016 m.

Chlamidiozė

Tai labai dažnai pasitaikanti infekcija, kurią sukelia bakterija *Chlamydia trachomatis*. Dažnai nėra jokių šios infekcijos simptomų. Jei jie pasireiškia, dažniausiai vargina nemalonius pojūtis, skausmas pilvo srityje, deginantis jausmas šlapinantis. Negydoma liga gali sukelti šlapimtakio, gimdos kaklelio, išeinamos angos gleivinių, akių junginės uždegimus, nevaisingumą, pažeisti sąnarius. Akmenės rajone chlamidiozės atvejai registruoti tik 2007 m. (2 atvejai) ir 2008 m. (1 atvejis). Nuo 2009 m. Akmenės rajone chlamidiozės atvejų nebuvo.

Duomenys apie nustatytus lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjus ir ŽIV

Pasireiškiantys LPI požymiai: niežėjimas ar bėrimas, paraudimas, skausmas lytinių organų srityje; skausmas šlapinantis, neskaidrus, stipraus kvapo šlapimas; žaizdelės ar pūslelės aplink lytinius organus, prie išangės ar burnoje; spazmai, maudimas pilvo srityje; genitalijų karpos; kraujo pasirodymas po lytinių santykių; išskyros iš šlapimo ir lytinių organų. Tačiau dažnai LPI užsikrėtęs asmenys nejaučia jokių simptomų. Pasitaiko, kad užsikrėtęs asmuo pastebi simptomus, kurie greitai pranyksta, arba LPI požymiai pasireiškia po kelių savaičių, mėnesių ar net metų. 2016 metais Akmenės rajone atlikta 213 tyrimų dėl ŽIV, 236 dėl sifilio, 2 tyrimai dėl chlamidiozės, o dėl gonorėjos nebuvo tirtasi.

Panaudota Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento informacija

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė